



## BIOESTIMULANTE

MÁS CALIBRE Y CALIDAD DE FRUTOS

• FICHA TÉCNICA •

### CARACTERÍSTICAS

**BIOFORCE** es un producto resultante de la combinación de extractos naturales de plantas y micronutrientes, formulados con la finalidad de incrementar el crecimiento de las plantas.

Los extractos naturales de plantas son reconocidos como fuentes de fitohormonas y enzimas que estimulan diferentes procesos metabólicos y fisiológicos.

El efecto Bioestimulante de **BIOFORCE** permite incrementar el calibre de la fruta sin retrasar la maduración y sin efectos negativos en post-cosecha.

Más CALIBRE  
y UNIFORMIDAD  
NATURALMENTE

Aumenta el CALIBRE  
de la fruta sin afectar  
la post-cosecha

Libre de  
Citoquininas  
Sintéticas

### Composición (p/v)



## Recomendaciones de Aplicación

| CULTIVO                    | DOSIS L/HA     | ÉPOCA DE APLICACIÓN   | OBSERVACIONES   |
|----------------------------|----------------|---|---|
| <b>Vides sin semillas</b>  | <b>1,5-2,0</b> | Bayas recién cuajadas (post-shatter) y repetir a los 5-7 días. Nota: Una alternativa a esta recomendación es realizar solamente una aplicación de 3,0 L/ha inmediatamente post-shatter. | Dirigido a todo el follaje con nebulizadora convencional o electrostática.  |
|                            | <b>3,0-4,0</b> | Inicio de ablande/ Inicio de pinta.   | Dirigido a todo el follaje, de preferencia con nebulizadora electrostática. |
| <b>Vid CV. Red Globe</b>   | <b>2,0-3,0</b> | Bayas recién cuajadas (post "shatter").   | Dirigido a todo el follaje con nebulizadora convencional o electrostática.  |
|                            | <b>4,0-5,0</b> | Inicio de ablande/ Inicio de pinta.   | Dirigido a todo el follaje, de preferencia con máquina electrostática.      |
| <b>Cerezos</b>             | <b>1,5-2,0</b> | Plena flor y repetir a los 7 días.  | Realizar 2 aplicaciones, con mojamiento acorde al tamaño de los árboles.    |
| <b>Arándanos</b>           | <b>1,0-2,0</b> | A partir de frutos recién cuajados, cada 7-10 días.   | Realizar 2-3 aplicaciones, con mojamiento acorde al tamaño de las plantas.  |
| <b>Carozos en general</b>  | <b>1,0-2,0</b> | Plena flor y repetir a los 7-14 días.   | Realizar 2 aplicaciones, con mojamiento acorde al tamaño de los árboles.    |
| <b>Cítricos</b>            | <b>1,5-3,0</b> | Plena flor y caída de pétalos.  | Realizar 2 aplicaciones/temporada.  |
| <b>Frutillas</b>           | <b>0,5-1,0</b> | Inicio de floración y repetir cada 15 días.   | Realizar 3-4 aplicaciones/temporada.  |
| <b>Hortalizas de Fruto</b> | <b>0,5-1,0</b> | Inicio de floración y repetir cada 15 días.   | Realizar 2 a 3 aplicaciones/temporada.                                      |

• **BIOFORCE** se debe aplicar vía foliar, mezclando con suficiente agua para asegurar una buena cobertura del follaje y frutos. Puede ser aplicado con equipos nebulizadores convencionales o con equipos electrostáticos.

### COMPATIBILIDAD

- **BIOFORCE** es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes comerciales, de modo que se puede usar en combinación con los mismos en aplicaciones foliares. Para mayor seguridad, cuando use **BIOFORCE** junto con otros productos, siempre haga una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder con volúmenes mayores.
- **BIOFORCE** no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

