

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INDUCTOR H-1 es un fertilizante órgano-mineral para uso foliar.

Composición	(p/v)
Nitrógeno (N)	1,00 %
Boro (B)	0,15 %
Extracto Orgánico*	35,00 %
Densidad	1.055 g/L
pH	3,7 - 3,8
Solubilidad (20°C)	100%

(*)Aminoácidos, Ácidos carboxílicos, Polioles.

Metales Pesados:

Pb < 1,0 ppm | Cd < 1,0 ppm | As < 1,0 ppm | Hg < 1,0 ppm

FERTILIZANTE FOLIAR



Contenido:

10 Litros 5 Litros 1 Litro



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



MBL FARM SPA

Camino San Miguel s/n, Parcela 2-2, Colina, Santiago.

www.mbl.cl

Producto fabricado por AQUA DO BRASIL.
Salto, S.P. Brasil.
www.aquadobrasil.com.br

INDUCTOR H-1

INSTRUCCIONES DE USO

- Evitar las horas de mayor temperatura.
- Evitar períodos de exceso de viento o rocío.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener el envase siempre cerrado.
- Mantener el envase fuera del alcance de niños y animales.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Mantener el envase cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- No ingerir, evitar el contacto directo con el producto.

LIMITACIONES DE USO

- Uso exclusivo como fertilizante foliar.
- Agite antes de usar.

CONDICIONES DE VENTA

MBL FARM SpA garantiza que este producto cumple con todas las características declaradas en la etiqueta antes de abrir el envase. Debido a que las condiciones de uso del producto, de clima, de suelo, etc., escapan al control de la empresa, no se otorga ningún tipo de garantía explícita o implícita en cuanto a los resultados obtenidos y bajo ningún concepto se podrá atribuir responsabilidad alguna. El comprador asumirá todos los riesgos de almacenamiento, utilización y/o aplicación de este producto.

RECOMENDACIONES DE USO

Pulverización foliar		
Cultivo	Dosis en 100 L de agua	Epoca de agua
Vides	150 - 200 mL	Aplicaciones quincenales a partir de inicio de pinta.
Frutilla	150 - 200 mL	Aplicaciones semanales iniciando con primeros frutos rojos.
Arándanos y otros Berries	150 - 200 mL	Aplicaciones quincenales a partir de inicio de pinta.
Frutales de carozo	150 - 200 mL	4 a 6 aplicaciones durante la temporada en el periodo de mayor crecimiento vegetativo.
Pomáceas	150 - 200 mL	4 a 6 aplicaciones durante la temporada en el periodo de mayor crecimiento vegetativo.
Hortalizas de Hoja	150 - 200 mL	Aplicaciones semanales iniciando después del trasplante.
Hortalizas de Fruto	150 - 200 mL	Aplicaciones semanales iniciando 15-20 días después del trasplante.
Ajos y Cebollas	150 - 200 mL	Aplicaciones semanales iniciando 15-20 días después del trasplante.