

CARACTERÍSTICAS

AVIVO es un Bioestimulante no microbiano, que actúa como desestresante. Está formulado a base de AATC, un derivado del aminoácido L-Cisteína y Ácido fólico, que aumenta el metabolismo de las plantas, mejorando su respuesta ante condiciones de estrés abiótico.

AVIVO está recomendado para ayudar a recuperar cultivos que hayan sido afectados por diversas condiciones de estrés, tales como bajas o altas temperaturas, sequía, anegamiento, granizo, entre otras.

COMPOSICION (p/v)

AATC (Derivado de L-Cisteína) 5,00%
Ácido fólico 0,10%

Contaminantes

Pb <0,5ppm | Cd <0,5ppm | As <2,0ppm | Hg <0,5ppm
Cr(4) 1,0ppm | Ni 0,5ppm | Cu 5ppm | Zn 5,00ppm
Escherichia coli: Ausente Salmonella spp.: Ausente

Parámetros fisicoquímicos

pH (Dilución 10% a 20°C) 3,5
Densidad (20°C) 1.020 g/L

CONDICIONES DE VENTA

MBL FARM SPA garantiza que este producto cumple con todas las características declaradas en la etiqueta antes de abrir el envase.

Debido a que las condiciones de uso del producto, de clima, de suelo, etc., escapan al control de la empresa, no se otorga ningún tipo de garantía explícita o implícita en cuanto a los resultados obtenidos y bajo ningún concepto se podrá atribuir responsabilidad alguna. El comprador asumirá todos los riesgos de almacenamiento, utilización y/o aplicación de este producto.

BIOESTIMULANTE DESESTRESANTE ABIOTICO



Contenido: 1 litro



Formulado y distribuido por:
MBL FARM SPA
Camino San Miguel s/n, Parcela 2-2,
Colina, Santiago.
www.mbl.cl

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar dirigido al follaje, de preferencia en las mañanas.

Cultivo	Dosis	Momentos de aplicación
Frutales y berries	0,5cc /L agua	Aplice en las etapas críticas del cultivo: Brotación, cuajado y crecimiento de frutos. Para incrementar la tolerancia a situaciones de estrés, aplique inmediatamente antes o después del evento.
Hortalizas de fruto	400-500 cc/hectárea	Aplice en las etapas críticas del cultivo: Post-trasplante, floración, cuajado y crecimiento de frutos. Para incrementar la tolerancia a situaciones de estrés, aplique inmediatamente antes o después del evento.
Hortalizas de hoja, ajos, cebollas	200-400 cc/hectárea	Aplice una semana post-trasplante y repita cada 15 días.
Papas	400-500 cc/hectárea	Usar rango inferior de la dosis en aplicaciones sucesivas cada 15 días a partir de inicio de tuberización. Usar dosis mayor en situaciones de estrés.
Cereales	200-300 cc/hectárea	Aplicar en inicio de macolla y repetir a los 15 días.
Cultivos en general	0,5 · 1,0 cc /L agua	Para revitalizar y sacar a las plantas de una situación de estrés.

AVIVO es un producto muy seguro de utilizar. No es fitotóxico a las dosis recomendadas, no posee carencias ni restricciones de ingreso a las áreas tratadas, pudiendo ser aplicado con toda la seguridad previo a la cosecha.

COMPATIBILIDAD

AVIVO es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios utilizados normalmente, excepto con aceites minerales, productos con cobre o azufre. Para mayor seguridad se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa, la humedad y el calor excesivo. Mantener fuera del alcance de niños y animales.