

CARACTERÍSTICAS

SORBER MAX es un Bioestimulante no microbiano que contribuye al desarrollo del sistema radicular. Está formulado a base de extractos de algas marinas y aminoácidos vegetales hidrolizados que, a las dosis recomendadas, estimulan a las plantas a sintetizar los precursores necesarios para el desarrollo de las raíces.

SORBER MAX contiene aminoácidos biológicamente activos, entre ellos el Triptófano, que estimula la síntesis endógena de la auxina Ácido Indol Acético (AIA), mejorando la capacidad de las plantas para enfrentar situaciones de estrés abiótico.

COMPOSICIÓN (p/v)

Ascomyllum nodosum	10,00%
Aminoácidos libres	4,50%

Contaminantes

Pb 3,00ppm | Cd 0,50ppm | As 3,00ppm | Hg <0,26ppm
Cr(6) 1,00ppm | Ni 0,50ppm | Cu 5,00ppm | Zn 5,00ppm
Escherichia coli: Ausente | Salmonella spp.: Ausente

Parámetros físicoquímicos

pH (Dilución 10% a 20°C) 8,5
Densidad (20°C) 1.099 g/L

CONDICIONES DE VENTA

MBL FARM SPA garantiza que este producto cumple con todas las características declaradas en la etiqueta antes de abrir el envase.

Debido a que las condiciones de uso del producto, de clima, de suelo, etc., escapan al control de la empresa, no se otorga ningún tipo de garantía explícita o implícita en cuanto a los resultados obtenidos y bajo ningún concepto se podrá atribuir responsabilidad alguna. El comprador asumirá todos los riesgos de almacenamiento, utilización y/o aplicación de este producto.



Fabricado por:
VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS S.L.
www.vellsam.com
País de procedencia: España

BIOESTIMULANTE PROMOTOR DE RAÍCES Uso vía fertirriego.

SORBER
MAX
Líquido Concentrado

Contenido: 20 litros



RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación vía fertirriego.

Cultivo	Dosis L/hectárea	Observaciones
Plantación de frutales	1,0- 2,0	Aplicar post-trasplante en el último tercio de riego y/o dirigido a las raíces, una vez que el frutal active su crecimiento. Repetir a los 15-20 días.
Frutales en Producción	2,0- 3,0	Aplicar durante el "flush" de crecimiento de raíces en primavera y post-cosecha. Incorporar el producto en el último tercio de riego, cuidando que sea localizado en el sector de las raíces.
Berries	1,5 - 2,0	Aplicar durante el "flush" de crecimiento de raíces en primavera y post-cosecha. Incorporar el producto en el último tercio de riego, cuidando que sea localizado en el sector de las raíces.
Hortalizas	0,75 - 1,5	Aplicar 5-7 días post-trasplante, en el último tercio de riego y/o dirigido a la base de las plantas. Repetir a los 15 días.
Invernaderos	1,0- 2,0	Aplicar en Primavera y Otoño.

SORBER MAX no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa, la humedad y el calor excesivo. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

COMPATIBILIDAD

SORBER MAX es compatible con nematicidas y con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios utilizados normalmente, excepto con los de marcada reacción alcalina. Para mayor seguridad, cuando se mezcle con otros productos químicos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente.

Importado y distribuido por:

MBL FARM SPA
Camino San Miguel s/n, Parcela 2-2,
Colina, Santiago.
www.mbl.cl